

# Gebrauchsinformation

*Liebe Patientin, lieber Patient!*

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## EXMYKEHL® D3 Zäpfchen

### Homöopathisches Arzneimittel

#### Zusammensetzung:

1 Zäpfchen enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,067 g **Candida albicans D3** trit. (HAB, Vorschrift 6); 0,067 g **Candida parapsilosis D3** trit. (HAB, Vorschrift 6); 0,067 g **Penicillium roquefortii D3** trit. (HAB, Vorschrift 6).

**Sonstige Bestandteile:** Hartfett.

**Darreichungsform und Inhalt:** 10/ 100 Zäpfchen zum Einführen in den After.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

**SANUM-KEHLBECK**

GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung

Postfach 1355 · D-27316 Hoya

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

**Hinweis an den Anwender:** Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie **EXMYKEHL® D3** nicht anwenden?*

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen und Hefepilzen.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Siehe unter Punkt Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Hinweis:** Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Lactose ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden Galactose-Unverträglichkeit (Galactose – Intoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose- Malabsorption.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:** Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- oder Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

*Wieviel und wie oft sollten Sie **EXMYKEHL® D3** anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet: Einmal täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

*Wie lange sollten Sie **EXMYKEHL® D3** anwenden?*

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.

Wenn Sie jedoch Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis:**

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum ist auf dem Zäpfchenstreifen und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Gebrauchsinformation:** 15. 08. 2002.

---

**Hinweis:**

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel vor Wärme geschützt auf!

Herstellungsbedingt können die Zäpfchen oben Einzugskegel aufweisen!